








ŠKROPILNI PROGRAM ZA VARSTVO JABLANE V LETU 2020 (EKOLOŠKA PRIDELAVA)

Varstveni ukrep	Čas	Razvojni stadij jablane	Bolezen ali škodljivec	Priporočeno sredstvo	Opomba
predpomladansko škropljenje	ob koncu meseca marca	odpiranje brstov (ff B–C ₃ ali BBCH 51-54) 	<u>ameriški kapar</u> , <u>jajčeca listnih uši</u> , <u>zimska jajčeca rdeče sadne pršice</u> <u>jablanov škrlup</u> <u>mali zimski pedic</u> , <u>zavijači lupine sadja</u> <u>zavijači lupine sadja</u>	Ovitex ali Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP ali Cuprablau Z 50 WP ali Cuprablau Z ultra WP ali Kocide 2000 ali Nordox 75 WG Agree WG, Delfin WG Lepinox plus	<u>Bakrovi pripravki lahko povzročajo pri nizkih temperaturah ožige!!!</u>
1. škropljenje proti j. škrlupu in j. pepelovki	v prvi dekadi aprila	začetek razvoja pecljev (ff D-E ali BBCH 56-57) 	<u>jablanov škrlup</u>	Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP ali Cuprablau Z 50 WP ali Cuprablau Z ultra WP ali <u>*Curatio</u> ali Kocide 2000	
			<u>jablanova pepelovka</u> <u>jablanova mokasta uš</u>	Biotip Sulfo 800 SC ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Pol-sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito-tekoče žveplo ali Thiovit jet ali Vindex NeemAzal-T/S	<u>Močljiva žvepla dobro delujejo pri temperaturi zraka nad 15°C!</u> <u>Do cvetenja lahko uporabimo močljiva žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku-preveriti odmerek pri posameznem pripravku (navodila za uporabo)!</u>

*** Pripravek Curatio bo imel zopet v letu 2020 dovoljenje za nujne primere (uporaba le za poklicne pridelovalce). Sredstvo ne bo v prosti prodaji ampak le neposredno prek zastopnika Metrob d.o.o.**

<p>8. škropljenje (10 – 12 dni po prejšnjem)</p>	<p>sredina junija</p>	<p>plodovi se razvijajo (debelijo)</p> 	<p><u>jablanov škrlup</u></p> <p><u>jablanova pepelovka</u></p> <p><u>jabolčni zavijač</u></p>	<p>Curatio ali Vitisan</p> <p>Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex</p> <p>*Laser plus + Madex max ali Carpovirusine</p>	<p>*S sredstvom <u>Laser plus</u> se lahko na istem zemljišču tretira največ 1 krat v eni rastni dobi!!!</p>
<p>9. škropljenje (10 – 12 dni po prejšnjem)</p>	<p>ob koncu junija</p>	<p>plodovi se razvijajo (debelijo)</p> 	<p><u>jablanov škrlup</u></p> <p><u>jablanova pepelovka</u></p> <p><u>jabolčni zavijač</u></p>	<p>Curatio ali Vitisan</p> <p>Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex</p> <p>Madex max ali Carpovirusine</p>	
<p>Po toči, zaradi nevarnosti širitve okužb s hruševim ožigom, priporočamo dodajanje pripravka Cuprablau-Z 35 WP (0,57 kg/ha) ali Cuprablau Z ultra 0,06%.</p>					
<p>10. škropljenje (12 – 14 dni po prejšnjem)</p>	<p>okrog 10. julija</p>	<p>plodovi se razvijajo</p> 	<p><u>jablanov škrlup</u></p> <p><u>jabolčni zavijač</u></p>	<p>*Curatio ali **Vitisan</p> <p>Madex max ali Carpovirusine</p>	<p>*Curatio se lahko uporabi do največ 11x v eni rastni sezoni.</p> <p>**Vitisan se lahko uporabi največ 6 x v eni rastni dobi!</p>
<p>11. škropljenje (12 – 14 dni po prejšnjem)</p>	<p>v začetku tretje dekade julija</p>		<p><u>jablanov škrlup</u></p> <p><u>jabolčni zavijač</u></p>	<p>Curatio ali Vitisan</p> <p>Madex max ali Carpovirusine</p>	
<p>12. škropljenje (12 – 14 dni po prejšnjem)</p>	<p>v začetku avgusta</p>		<p><u>jablanov škrlup in skladiščne bolezni</u></p> <p><u>jabolčni zavijač</u></p>	<p>Amylo-X ali Vitisan</p> <p>Madex max ali Carpovirusine</p>	

13. škropljenje (12 – 14 dni po prejšnjem)	sredina avgusta		<u>jablanov škrlup in skladiščne bolezni</u> <u>jabolčni zavijač</u>	Amylo-X ali Vitisan Madex max ali Carpovirusine	<u>Upoštevamo predpisane karence!</u>
14. Škropljenje (pozne sorte)	konec avgusta – začetek septembra		<u>jablanov škrlup in skladiščne bolezni</u>	Amylo-X ali Vitisan	<u>Upoštevamo predpisane karence!</u>

V tem škroplnem programu so vključeni le pripravki oz. fitofarmaceutvska sredstva (FFS), ki so registrirana za uporabo v ekološki pridelavi grozdja v Republiki Sloveniji.

Sredstva za krepitev rastlin in podobna niso vključena v škroplni program, ker niso uradno registrirana kot fitofarmaceutvska sredstva (FFS)!

POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO NAMENITI VSEM OPOZORILOM, KI SO NAVEDENA V NAVODILU ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA (št. dovoljenih tretiranj, fitotoksičnost, karenca, varnostni pasovi od voda I. in II. reda, varstvo čebel, voditi evidence o uporabi FFS, hraniti račune o nabavi FFS...).

PRED UPORABO PRIPRAVKA OBVEZNO NATANČNO PREBRATI PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA!!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN (KGZS – ZAVOD MARIBOR)

*mag. Jože Miklavc,
mag. Boštjan Matko,
Miro Mešl univ. dipl. inž. kmet.,
Leonida Lešnik mag. inž. hort.*