

Javna služba v sadjarstvu (JSS) in Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) opozarjata pred nevarnostjo pozebe cvetov oz. rodnega nastavka.

Po napovedih ARSO je za začetek drugega tedna napovedana možnost nizkih jutranjih temperatur. V preteklih dneh so kmetijski svetovalci, specialisti za sadjarstvo pri KGZS zbrali ter posredovali JSS nekaj informacij s terena.

Večinoma poročajo za jabloano v kontinentalnem delu Slovenije, da je bila v fenološki fazi BBCH 53 ali BBCH 54-(fazi mišjega ušesca C3). Na izpostavljeni lokacijah in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summarred), pa vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55).

Hruške so bile včeraj v povprečju v fenološki fazi BBCH 54, 55 in 56.

Kdor ima možnost za aktivno zaščito z oroševanjem ali mikrooroševanjem, naj se pripravi.

Preglejte Tehnološka navodila pred spomladansko pozebo, kjer so opisane možnosti za aktivno in pasivno zaščito sadnega drevja.

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_zascito_pred_spomladansko_pozebo_v_sadjarstvu_2018.pdf



Preglednica : Občutljivost različnih sadnih vrst na spomladansko pozebo v različnih fazah razvoja (Zinoni et al, 2000)

| Oznaka fenofaze | A | B | C-C ₃ | D-D ₃ | E-E ₂ | F-F ₂ | G | I | J |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Fenofaze | Zimski brst | Nabrekanje brstov | Odpiranje brsta- mišja ušesa | Vidni cvetni brsti - stadij balona | Začetek cvetenja | Polno cvetenje | Odpadanje venčnih listov | Cvetna čaša odpade - slačenje plodov | Debelitev plodov |
| Breskve | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | | -4 | -4 | -3,3 | -2,8 | -2,2 | -1,8 | -1 | -1 |
| 10 % poškodb pri °c | | | -6,1 | -3,9 | -3,3 | -2,7 | -2,2 | | |
| 90 % poškodb pri °c | | | -15 | -9,1 | -5,6 | -4,4 | -3,9 | | |
| Slive | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | -20 | -5 | -4 | -3 | -2,8 | -2 | -1,5 | -0,5 | |
| 10 % poškodb pri °c | | -8,3 | -6,6 | -3,3 | -2,8 | -2 | -1,5 | | |
| 90 % poškodb pri °c | | -16 | -14 | -5,6 | -5 | -5 | -5 | | |
| Marelice | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | -9,4 | -4 | -4 | -3,5 | -3 | -2,2 | -0,8 | -0,5 | -0,5 |
| 10 % poškodb pri °c | | | -6,2 | -4,9 | -4,3 | -2,9 | | -2,6 | -2,3 |
| 90 % poškodb pri °c | | | -14 | -10 | -10 | -5,6 | | -4,4 | -3,3 |
| Češnje | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | | -5 | -4,5 | | -2,2 | -1,7 | -1,1 | -1 | -1 |
| 10 % poškodb pri °c | | | | -2,7 | -2,7 | -2,4 | -2,1 | | |
| 90 % poškodb pri °c | | | | -6,2 | -4,9 | -3,9 | -3,6 | | |
| Jablane | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | | -7 | -4 | | -2,2 | -2 | -1,8 | -1,6 | -1,6 |
| 10 % poškodb pri °c | | -9,4 | -5 | -2,8 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| 90 % poškodb pri °c | | -17 | -9,4 | -6,1 | -4,4 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
| Hruške | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | | -7 | -6 | -2,8 | -2 | -1,6 | -1,5 | | -1 |
| 10 % poškodb pri °c | | -9,4 | -6,7 | -3,3 | -2,8 | -2,2 | -2,2 | | |
| 90 % poškodb pri °c | | -18 | -14 | -5,6 | -5 | -4,4 | -4,4 | | |
| Aktinidija | | | | Zelene konice | Odprti listi | | | | |
| Kritična temperatura °c | -15 | -2 | -1 | -0,5 | 0 | | | | |
| Vinska trta | | | | | | | | | |
| Kritična temperatura °c | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 -1,5 | | | | |