

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ

Datum: 29. 5. 2017

Zgodnje sorte češenj so v SV Sloveniji že pričele zoreti (BBCH 89), medtem, ko so se pričele pozne sorte barvati (BBCH 81). Sadjarjem priporočamo, da obesijo rumene lepljive plošče, saj se je let češnjeve muhe pričel v začetku preteklega tedna. V primeru preseženega praga škodljivosti (ena muha na dve postavljeni vabi do faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno) priporočamo zatiranje s pripravkom **Spada 200 EC** v 2,5 L/ha (14 dni karence), **Imidan 50 WG** v 1,5 kg/ha (14 dni karence), **Mospilan 20 SG** v 0,375 kg/ha (14 dni karence) in **Naturalis** 2,0 L/ha (karence ni).

Na vrtovih za zatiranje češnjeve muhe uporabe insekticidov ne priporočamo, tudi zaradi velike možnosti zanašanja škropilne brozge na sosednje površine, kot tudi upoštevanja razdalj od sosednih objektov (npr. hiš). Po izkušnjah lahko zadovoljivo učinkovitost zmanjšanja populacije češnjeve muhe dosežemo z obešanjem rumenih lepljivih plošč (do 10 na drevo) na vzhodno oz. sončno stran dreves. Rumene plošče je potrebno po obiranju odstraniti z dreves.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN