



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

## OBVESTILO O VARSTVU PETRŠILA IN ZELENE

Na zeleni opazamo pojav listne pegavosti zelene, na peteršilju pa listno pegavost peteršilja. Obe bolezni se pojavljata na listih kot rumenosive do rjave pege. Kot posledica okužb se listje prične sušiti. Za zatiranje je mogoče uporabiti Score 250 EC v 0,5 L/ha (samo za gomoljno in belušno zeleno peteršilj za listje) ali Ortiva v 1,0 L/ha (samo za gomoljno in belušno zeleno in peteršilj samo za koren, brez listja) ali Signum v 1,0 kg/ha (peteršilj za pridelavo korena)

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

## OBVESTILO O VARSTVU KORENJA

Na listih korenja opazamo pojav korenjevega listnega ožiga. Na listih se pojavljajo svetlo rumene pege, ki posivijo, rob peg ostane rumen, nato listi počrniijo in se posušijo. Bolezen se pojavlja samo na posameznih sortah, zato priporočamo pregled posevkov.

Za zatiranje je mogoče uporabiti sledeče fungicide:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca (dni)	opombe
azoksistrobin	Ortiva	1 l/ha	14 dni	Škropimo, ko je napadeno 1-2% listne površine. Tretira se največ 2 krat v eni sezoni.
iprodition	Rovral aquaflo	1,5 L/ha	27 dni	Tretira se ob pojavu prvih znakov bolezni, največ 4 krat letno, v 10 do 14 dnevni presledkih.
boskalid + piraklostrobin	Signum	0,75 do 1 kg/ha	14 dni	Tretirati je dovoljeno največ dvakrat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7-14 dni.
fludioksonil + ciprodinil	Swich 62,5 WG	0,8 kg/ha	7 dni	Tretira se lahko od pojava četrtega pravega lista dalje (BBCH 14), največ trikrat v eni rastni dobi, razmik med tretiranjimi mora biti najmanj 12 dni.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

---

fluopiram + tebukonazol	Luna experience	1,0 L/ha	14 dni	Tretirati se začne od razvojne faze, ko se začne večati obseg korena, do razvojne faze, ko je konec večanja obsega korena (BBCH 41-49); uporabi se ga v razmiku 14 dni.
<i>Bacillus subtilis</i> <i>QST 713</i>	Serenade ASO	8 L/ha	Ni potrebna	Tretiramo v razvojnih fazah, ko rastlina razvija koren (BBCH 41 do 49), največ 6 krat v eni rastni dobi.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN