

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV po toči

Neurja s točo, ki so včeraj popoldne zajela nekatere dele severovzhodne Slovenije, so povzročila na listih in grozdih vinske trte poškodbe. V vinogradih brez pridelka ali v primeru škropljenja samo po listju priporočamo uporabo enega od pripravkov, kot so: **Badge WG** (2,5 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WG** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 50 WP** (2 kg/ha), **Cuprablau Z ultra WP** (1,8 kg/ha), **Cuproxat** (5,3 L/ha), **Kocide 2000** (2,0 kg/ha) ali **Nordox 75 WG** (1,6 kg/ha).

V vinogradih, kjer so poškodovane tudi grozdne jagode, priporočamo pri poznih sortah ('laški rizling', 'renski rizling', 'šipon', 'žametna črnina') dodajanje enega od »botriticidov« s krajšo karenčno dobo, npr.: **Amylo-X** ali **Botector** ali **Cantus** ali **Mythos** ali **Prolectus** ali **Pyrus 400 SC** ali **Scala** ali **Serenade ASO** ali **Switch 62,5 WG** ali **Teldor SC 500**. Pri srednje poznih sortah z višjimi sladkornimi stopnjami je mogoče uporabiti sredstva z najkrajšo karenco, npr. Teldor, Prolectus ali pa se po posvetu s specialistično svetovalno službo za vinarstvo odločiti za predčasno trgatav.

Priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin** ali **podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Opozorjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo:

Badge WG – 21 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP, WG – 21 dni, Cuprablau Z ultra WP – 21 dni, Nordox 75 WG – 21 dni, Cuproxat – 21 dni, Kocide 2000 – 21 dni

Amylo-X – karenca ni potrebna, Botector – zagotovljena s časom uporabe, Cantus WG – 28 dni, Mythos – 21 dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus – 35 dni, Scala – 21 dni, Serenade ASO - karenca ni potrebna, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – 14 dni, Zenby – 21 dni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.