



OBVESTILO O VARSTVU KUMAR

Zaradi ugodnih vremenskih razmer (pogoste padavinev zadnjih dneh) je velika možnost okužb s **kumarno plesnijo** na kumarah. Za preprečitev okužb je mogoče uporabiti sledeče pripravke; Aliette Flash, Aliette Aliette WG (vsi v 4,0 kg/ha), Alleato 80 WG (1-4 kg/ha), Ortiva (1,0 L/ha), Ridomil MZ (3,0 kg/ha), Antracol in Antracol WG (0,3 %), Champ formula 2 FL (2,8 L/ha), Enervin (1,5 kg/ha), Ranman top (0,5 L/ha), Champion 50 WG (2,0 kg/ha), Tanus 50 WG (0,23 kg/ha), Curzate C extra (2 kg/ha). Presledki med škropljenji naj bodo 7 do 10 dnevni.

Na kumarah opazamo ponekod močnejši pojav **pepelovke bučnic**. Za zatiranje je mogoče uporabiti pripravek Ortiva 0,48 do 0,96 L/ha, Karathane gold EC 350 (0,04 – 0,06%), Topas 100 EC ali Topaze v 0,5 l/ha (uporaba samo v zaščiteneh prostorih), Collis v 0,5 kg/ha (uporaba samo v zaščiteneh prostorih), Score 250 EC v 0,5 l/ha, Duaxo koncentrat v 1,0%, Cosan, Kumulus DF, Pepelin; Vindex 80 WG, Microthiol SC (manjša uporaba), Microthiol special v odmerku 5 – 7,5 kg/ha, AQ 10 v odmerku 35g/ha, Vitisan v odmerku 1,5-3 kg/ha, Systhane 20 EW v odmerku 0,15 L/ha, ter Serenade ASO v odmerku 8 l/ha (manjša uporabe).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN