



OBVESTILO O VARSTVU BUČK

Na bučkah in bučah opažamo ponekod močnejši pojav **pepelovke bučnic**. Za zatiranje je mogoče uporabiti pripravke **Ortiva** 1,0 L/ha, **Topas 100 EC** ali **Topaze v 0,5 l/ha** (uporaba samo v zaščiteneh prostorih), **Collis v 0,5 kg/ha** (uporaba samo v zaščiteneh prostorih), **Score 250 EC** v 0,5 l/ha, **Duaxo koncentrat** v 1,0%, **Cosan**, **Kumulus DF**, **Pepelin**; **Vindex 80 WG**, **Microthiol SC** (manjša uporaba), **Microthiol special** v odmerku 5 – 7,5 kg, L/ha, **AQ 10** v odmerku 35g/ha, **Vitisan** v odmerku 1,5-3 kg/ha, **Sythane 20 EW** v odmerku 0,15 L/ha, ter **Serenade ASO** v odmerku 8 l/ha (manjša uporabe). Presledki med škropljenji naj bodo 7 do 10 dnevni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN