



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O VARSTVU VRTNIN PRED KAPUSOVO MUHO

Datum: 12. 9. 2017

Kontrola rastlin zelja, brstičnega ohrovt, črne redkve in strniščne redkve v zadnjem tednu je pokazala, da je kapusova muha tretjega rodu že pričela odlagati jajčeca. Muha je v obdobju množičnega odlaganja jajčec, saj je bilo na posamezni kontrolirani lokaciji najdenih že do 50% rastlin z odloženimi jajčeci. Priporočamo pregled posevkov. Za zatiranje kapusove muhe ni registriranega pripravka, zato kemično varstvo ni mogoče.

Na manjših površinah priporočamo, da posevke čim prej pokrijete s kopreno (npr. vrteks ali podobno). S tem preprečite prilet škodljivca in odlaganje jajčec.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVIMI VRSTAMI GOSENIC

Datum: 12. 9. 2017

V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet metuljkov kapusovega molja in sovk. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V primeru prerazmnožitve omenjenih škodljivcev in preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče insekticide: **Fastac 100 EC** v 0,1 l/ha (B, BO, Z, O), **Steward 85 g/ha** (BR, BO, C, Z), **Mimic 0,3 – 0,4 L/ha** (K), **Lepinox plus 1,0 kg/ha** (BO, BR, O, Z, KZ), **Affirm 1,5 kg/ha** (Z, CV, BR) in **Neemazal – T/S 3,0 L/ha** (V), **Decis 100 EC 75 ml/ha** (BO, Z, C). Samo za zatiranje kapusove sovke je mogoče uporabiti še: **Karate Zeon 5 CS** v 0,2 L/ha (BO, Z), **Karis 10 SC** v 50 ml/ha (BO, Z, C, O, B), **Delfin WG** v 0,5 kg/ha (K) in **Bulldock EC 25** v 0,3 do 0,5 L/ha (O, Z, KZ), **Agree WG** v 1,0 kg/ha (K).

Legenda: (BO=brstični ohrovt, BR=brokoli, C=cvetača, KO=kolerabica, O=ohrovt, Z=zelje, K=kapusnice, KZ=kitajsko zelje, V=vrtnine,).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN