

Varstvo česna pred česnovo rjo

Datum: 23. 5. 2019

Pridelovalce česna obveščamo, da se v posevkih česna začela pojavljati česnova rja. Bolezenska znamenja česnove rje je mogoče opaziti na spodnjih listih v manjšem obsegu, vendar lahko ob ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo okužbe v večjem obsegu. Za zatiranje česnove rje je registriran so registrirani sledeči pripravki:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca	Registriran na: opombe
baker v obliki bakrovega oksiklorida	Cuprablau Z 35 WP -za manjše uporabe	1,8 kg/ha	3 dni	Čebula, česen, šalotka na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v 7 do 10 dnevnih razmikih.
azoksistrobin	Ortiva Zaftra AZT 250 SC Mirador 250 SC	1 L/ha	7 dni za spomladansko čebulo, 14 dni za česen, šalotko, drobnjak, čebula 21 dni za por	V česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjem mora biti najmanj 7 dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora.
azoksistrobin	Chamane	1,0 l/ha	21 dni	V poru, za zatiranje rje (<i>Puccinia sp.</i>) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranjii v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 12 dni.
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1,0 L/ha	14 dni za česen, 21 dni za por	Česen - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 14-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjii mora biti najmanj 7 dni. Por - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjii mora biti najmanj 12 dni.
fluopiram+tebukonazol	Luna experience	1,0 L/ha	7 dni za česen	V česnu, od razvojne faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do

	-za manjše uporabe v česnu			razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41-49).
boskalit + piraklostrobin	Signum – manjše uporabe	1,5 kg/ha	14 dni	Por. Tretira se od fenološke faze, ko je doseženo 10% listne mase (BBCH 41), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranja v eni rastni dobi. Razmak med tretiranjima naj bo 14-21 dni.
difenokonazol + fluksapiroksad	Sercadis plus – manjše uporabe	1 L/ha	dni	Por in spomladanska čebula. V fenološki fazi od razvitega tretjega lista do faze, ko je dosežena značilna listna masa (BBCH 13-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranjima naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.