

Obvestilo o zatiranju porove zavrtavke (*Napomyza gymnostoma* (Loew) in resarjev

Datum: 21. 9. 2020

Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki.

Na manjših površinah česna, navadne čebule in pora priporočamo, da posevke čim prej pokrijete s kopreno (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečite prilet škodljivca in odlaganje jajčec.

V nasadih pora so bile ugotovljene tudi poškodbe od resarjev. Priporočamo postavitve modrih lepljivih plošč za spremljanje populacije resarjev. Za zmanjšanje številčnosti populacije resarjev je na poru in čebuli registriran pripravek **Laser 240 SC** v odmerku 0,45 L/ha (4,5 ml/100 m²) in **Laser plus** v odmerku 0,2 L/ha, ki ju je potrebno uporabiti ob izleganju prvih ličink, samo na čebuli, česnu in šalotki za zmanjšanje populacije cvetličnega resarja pa **Benevia** v odmerku 0,75 L/ha ob porabi vode od 200 do 800 L/ha.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN