



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI

Datum: 5. 6. 2017

Vremenske razmere v zadnjem tednu meseca maja in v začetku junija so bile za okužbe in širjenje krompirjeve - paradižnikove plesni izredno ugodne. Prve pege krompirjeve - paradižnikove plesni smo odkrili 8. junija.

Priporočamo, da se rastline paradižnika natančno pregledajo in da se v kolikor še ni bilo opravljeno škropljenje, čim prej opravi preventivno škropljenje z enim od spodaj naštetih fungicidov.

Galben M 2,5 kg/ha (35 dni karence), Banko 2,0 l/ha (3 dni), Antracol 0,3%, Antracol 70 WG 0,3% (14 dni na prostem, 28 dni v zaščiteneh prostorih), Acrobat MZ WG 2,0 kg/ha (3 dni), Biotip bakrov fungicid plus 4 – 5 L/ha (14 dni), Curzate C Extra 2 kg/ha (3 dni), Dithane DG Neotec, Dithane M-45 oba 2,0 kg/ha (3 dni na prostem), Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha (10 dni za paradižnik za predelavo, 3 dni paradižnik za svežo uporabo), Cuprablau Z 35 WG 1,6 kg/ha (karenca zagotovljena s časom uporabe), Forum MZ WG 2,0 kg/ha (3 dni), Gett 2,5 kg/ha (3 dni), Galben C 4,0 kg/ha (14 dni), Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG vsi 2,0 kg/ha, Pinozeb M-45 (3 dni na prostem), Kocide 2000 2,0 kg/ha (10 dni za paradižnik za predelavo, 3 dni paradižnik za svežo uporabo), Nautile DG 2,0 kg/ha (3 dni), Pergado C 5,0 kg/ha (3 dni), Ortiva 0,48 – 0,72 L/ha (samo v zaščiteneh prostorih – 3 dni), Nordox 75 WG (10 dni za paradižnik za predelavo, 3 dni paradižnik za svežo uporabo), Pergado MZ 2,5 kg/ha (3 dni), Ranman Twinpack 0,2 L/ha fungicida Ranman + 0,15 L/ha močila Ranman Aktivator (3 dni), Revus 0,6 L/ha (3 dni), Ridomil Gold MZ Pepite 2,5 kg/ha (14 dni), Polyram DF 2,0 kg/ha (14 dni karence).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN