

**OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE PRED ČEBULNO PLESNIJO**

Na območju severovzhodne Sloveniji so vremenske razmere v zadnjih štirinajstih dneh s pogostimi neurji in obilnimi padavinami omogočile nove okužbe in širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednjimi fungicidi:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca	Registriran na: opombe
baker v obliki bakrovega hidroksida	Champion 50 WG	2 kg / ha	3 dni	Čebula, česen, šalotka na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14-47). Tretira se v časovnih intervalih 7- 14 dni.
baker v obliki bakrovega hidroksida	Champ formula 2 FLO – za manjše uporabe	2,8 l/ha	3 dni	V čebuli, česnu in šalotki, gojenih na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14-47). Tretira se v časovnih intervalih 7- 14 dni.
baker v obliki bakrovega oksiklorida	Cuprablau Z 35 WG -za manjše uporabe	1,5 kg/ha (15 g na 100 m <sup>2</sup> )	3 dni	V čebuli, česnu, šalotki in spomladanski čebuli. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, ob pojavu pogojev za okužbo.
baker v obliki bakrovega oksiklorida	Cuprablau Z 35 WP -za manjše uporabe	1,8 kg/ha	3 dni	Čebula, česen, šalotka na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v 7 do 10 dnevnih razmikih.
baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfat	Cuproxat -za manjše uporabe	5,3 l/ha	3 dni	V čebuli, česnu in šalotki na prostem, v razvojni fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14 do 47), v 7-14 dnevnih intervalih največ 4 krat v rastni sezoni.
azoksistrobin	Ortiva Mirador 250 SC Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	7 dni za spomladansko čebulo, 14 dni za česen, šalotko drobnjak čebula 21 dni za por	V česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjem česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora.
mankozeb	Pennozeb 75 DG	2,0 kg/ha	28 dni	Čebula Tretira se od fenološke faze, ko je drugi list jasno viden (> 3 cm), do faze, ko pridelek doseže 50 % predvidenega



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

				premera
mankozeb metalaksil-M	Ridomil GOLD MZ PEPITE Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2,5 - 3 kg/ha	21 dni	Čebula, česen, šalotka. Prvo tretiranje se opravi po napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma ko nastopijo ugodne razmere za razvoj bolezni, to je od fenološke faze naprej, ko je peti pravi list popolnoma viden (BBCH 15). Vsa nadaljnja tretiranja se opravi v presledkih 10-14 dni.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN