

OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE PRED SIVO PLESNIJO ČEBULNIH LISTOV

Čebula se je v severovzhodni Sloveniji že pričela debeliti (BBCH 401). Visoke temperature in pogoste padavine z lokalnimi neurji so omogočile pogoje za okužbo s sivo plesnijo čebulnih listov. Priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednjimi fungicidi:

aktivna snov	preparat	odmerek	karenca	Registriran na: opombe
fluopiram+ tebukonazol	Luna experience	0,5 L/ha	7 dni za čebulo	Čebula, od razvojne faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41-49). Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni.
boskalid+ piraklostobin	Signum -za manjše uporabe	1,5 kg /ha	21 dni za česen, 14 dni za šalotko, spomladansko čebulo in čebulo	V česnu, šalotki, spomladanski čebuli (zimski luk in podobno) ter čebuli na prostem Tretira se od fenološke faze razvitega petega pravega lista do fenološke faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 15-48) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranja v eni rastni dobi. Razmik med tretiranjima naj bo 7-10 dni.
azoksistrobin	Ortiva Mirador 250 SC Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	7 dni za spomladansko čebulo, 14 dni za česen, šalotko drobnjak čebula 21 dni za por	V česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjima mora biti najmanj 7 dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.