






## ŠKROPILNI PROGRAM ZA SADNO DREVJE NA VRTU V LETU 2015

Varstveni ukrep	Čas	Razvojni stadij	Bolezen ali škodljivec	Priporočeno sredstvo	Opomba
<b>Predpomladansko škropljenje breskev, češenj in višenj</b>	sredi marca	odpiranje brstov ff B-C	<b>breskova kodravost, listna luknjičavost koščičarjev</b>	Champion 50 WG ali Cuprablau-Z 35 WP ali Cuprablau-Z ultra WP ali Bordojska brozga Caffaro	Če v tem času že brstijo hruške, češnje, višnje..., tudi njih poškopimo z isto škropilno brozgo.
			<b>čespljev kapar, murvov kapar, ameriški kapar, jajčeca listnih uši</b>	Frutapon ali Ogriol	
<b>Jablana</b>			<b>jablanov škrlup</b>	Champion 50 WG ali Cuprablau-Z 35 WP ali Cuprablau-Z ultra WP ali Cuproxat ali Nordox 75 WG	<u>Bakrovi pripravki lahko pri nizkih temperaturah povzročajo ožige!!</u>
<b>Breskve</b> Ob koncu marca D - E			<b>breskova kodravost</b>	Ziram 76 WG	
<b>1. škropljenje jablan proti j. škrlupu in j. pepelovki</b>	v prvi dekadi aprila	začetek razvoja cvetnih pecljev ff D-E	<b>jablanov škrlup</b>	<b><u>Kontaktni fungicid:</u></b> Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC ali Thiram 80 WG ali Chorus 50 WG ali Mythos ali Pyrus 400 SC	
					
			<b>jablanova pepelovka</b>	Cosan ali Kumulus ali Microthiol special ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex	Močljiva žvepla dobro delujejo pri temp. nad 15°C.
			<b>listne uši</b>	<u>Pirimor 50 WG ali Teppeki</u>	
<u>Pripravek Pirimor 50 WG in Teppeki kažeta dober stranski učinek na krvavo uš.</u>					
<b>Breskve</b>	v prvi dekadi aprila		<b>breskova kodravost</b>	Syllit 400 SC ali Ziram 76 WG	
<b>Če je v času brstenja breskev vreme deževno, škropimo breskve proti breskovi kodravosti skupaj 3x (zadnjič tik pred cvetenjem).</b>					
<b>2. škropljenje jablane (po 10 dneh) proti j. škrlupu in j. pepelovki</b>	sredi aprila	cvetni peclji so razviti ff E-E <sub>2</sub>	<b>jablanov škrlup</b>	Chorus 50 WG ali Mythos ali Pyrus ali Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC	
					

**jablanova  
pepelovka**

Cosan ali Kumulus ali Microthiol  
special ali Močljivo žveplo ali  
Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex

**Pred cvetenjem lahko uporabimo močljiva žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku.**

**Breskve,  
nektarine,  
marelice**

cvetenje

**cvetna monilija,  
plodova monilija**

Chorus 50 WG ali Rovral Aquaflor  
Switch 62,5 WG ali Topsin-M

**Češnje in  
višnje**



**cvetna monilija,  
plodova monilija**

Duaxo koncentrat ali Luna  
experience ali Octave ali Rovral  
Aquaflor ali Switch 62,5 WG ali  
Teldor SC 500 ali Topsin-M

Prvič škropimo,  
ko je odprtih 10%  
cvetov; drugič ko  
začnejo odpadati  
prvi venčni listi.

**Slive in  
češplje**

**cvetna monilija,  
plodova monilija**

Chorus 50 WG ali Octave ali  
Rovral Aquaflor ali Switch 62,5 WG  
ali Teldor SC 500 ali Topsin-M

**V času cvetenja ne uporabljamo pripravkov na osnovi aktivne snovi dodina (Syllit) in kaptana (Merpan...)!**

**V času cvetenja ni dovoljena uporaba pripravkov, ki so nevarni oz. strupeni za čebele!!!**

**3.  
škropljenje  
(po 10 dneh)  
proti  
j. škrlupu  
in j. pepelovki**

v tretji  
dekadi  
aprila

začetek  
cvetenja  
ff F



**jablanov škrlup**


Antracol ali Delan ali Dithane ali  
Manfil ali Mankoz ali Merpan ali  
Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali  
Penncozeb 75 DG ali  
Polyram DF ali Syllit 400 SC

**j. pepelovka**

Uporabimo močljivo žveplo  
(2 kg/ha), npr.: Cosan ali Kumulus ali  
Microthiol special ali Močljivo žveplo  
ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex

**Slive in  
češplje**

po  
končanem  
cvetenju



**rumena in črna  
češpljeva  
grizlica**

Mospilan 20 SG ali Moksycan 20 SG

**Pokositi cvetočo podrast –  
VARSTVO ČEBEL!**

**Škropimo le, če se je  
med cvetenjem na  
bele lepljive plošče  
ujelo več kot  
30 osic !!!**

**VARSTVO ČEBEL!**

**Breskve in  
nektarine**

po  
končanem  
cvetenju

**listne uši**

Actara 25 WG ali Calypso SC 480 ali  
Confidor 200 SL ali Kohinor SL 200  
ali Mospilan 20 SG ali Moksycan 20  
SG ali Pirimor 50 WG ali Teppeki

**Škropimo samo  
napadena drevesa in  
če je napadenih več  
kot 5% poganjkov.**

**VARSTVO ČEBEL!**

**Češnje in  
višnje**

po  
končanem  
cvetenju

**listne uši**

Calypso SC 480 ali Confidor 200 SL  
ali Kohinor SL 200 ali Neemazal-T/S

**VARSTVO ČEBEL!**

**Slive in  
češplje**

po  
končanem  
cvetenju

**listne uši**

Confidor 200 SL ali Kohinor SL 200  
ali Mospilan 20 SG ali Moksycan 20  
SG

**VARSTVO ČEBEL!**

**4.  
škropljenje  
proti  
j. škrlupu,  
j. pepelovki,  
listnim ušem**

v začetku  
maja

končano  
cvetenje  
ff H



**jablanov škrlup**

Antracol ali Delan ali Dithane ali  
Manfil ali Mankoz ali Merpan ali  
Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali  
Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali  
Syllit 400 SC

**jablanova pepelovka**

Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan ali Kumulus ali Microthiol special ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex **ali** Topas 100 EC ali Topaze

**listne uši,**  
**\*\* jab. grizlica**

\* Actara 25 WG ali **Calypso SC 480 ali**  
\* Mospilan 20 SG

\* Pokositi cvetočo podrast – VARSTVO ČEBEL!

**\*\* Jabolčno grizlico zatiramo le, če se je med cvetenjem na bele lepljive plošče ujelo več kot 30 osic!!!**

**\*rdeča sadna pršica**

Envidor ali Masai ali Milbeknock ali Vertimec + močilo

**V času cvetenja se priporoča uporaba pripravek Calypso SC 480, ki ni strupen za čebele !!!**

\*Envidor, Masai, Milbeknock ali Vertimec lahko uporabimo šele po končanem cvetenju !!!

Pri pripravku Milbeknock je potrebno upoštevati omejitve glede uporabe pripravka (sorta, vremenske razmere,...), zaradi možnosti nastanka fitotoksičnosti – NAVODILA ZA UPORABO!!!

<b>Breskve</b>	maj, junij in julij	<b>breskov škrlup</b>	Syllit 400 SC
		<b>breskova pepelovka</b>	Uporabimo močljivo žveplo, npr.: Cosan ali Kumulus ali Microthiol special ali Pepelin ali Močljivo žveplo ali Thiovit jet ali Vindex ali Topas 100 EC ali Topaze

**5. škropljenje proti j. škrlupu in j. pepelovki (presledek 10-14 dni)**

sredi maja

plodiči se razvijajo ff I-J



**jablanov škrlup**

Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC

**jablanova pepelovka**

Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan ali Kumulus ali Microthiol special ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex **ali** Topas 100 EC ali Topaze

**6. škropljenje jablane proti j. škrlupu, j. pepelovki, j. zavijaču**

v tretji dekadi maja

plodovi se razvijajo ff J



**jablanov škrlup in j. pepelovka**

enaki pripravki kot pri 4. škropljenju


Dodamo 2 kg/ha močljivega žvepla (Cosan, Kumulus, Pepelin,...)

**jabolčni zavijač (Varstvo čebel!!!)**

Calypso SC 480 ali Mimic ali Runner ali Steward ali Coragen ali Madex ali Carpovirusine

Calypso SC 480 deluje tudi proti listnim ušem!

**Češnje in višnje**







**črna češnjeva uš**




Calypso SC 480 ali Confidor 200 SL ali Kohinor SL 200 ali Neemazal-T/S

**VARSTVO ČEBEL!!!**

Škropimo le v primeru, če je napadenih 3% ali več poganjkov.

**KARENCA!!!**

<b>7. škropljenje jablane proti</b>	v prvi dekadi junija	junijsko redčenje plodov	<b>jablanov škrlup</b>	Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC	
<b>j. škrlupu, j. pepelovki in j. zavijaču</b>	ff J 	<b>jablanova pepelovka</b>	Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan ali Kumulus ali Microthiol special ali Močljivo žveplo ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex <b>ali</b> Topas 100 EC ali Topaze	Kontaktni insekticid Pyrinex uporabimo proti j. zavijaču, če nismo že prej uporabili insekticida.	
<b>jabolčni zavijač</b>	Pyrinex 25 CS ( <b>Varstvo čebel!!!</b> ) ali Madex ali Madex max ali Carpovirusine	<b><u>Pripravek Madex, Madex max lahko dodamo insekticidu za zatiranje j. zavijača v odmerku 0,05 l/ha. Pripravek Pyrinex 25 CS ima stranski učinek na ameriškega kaparja.</u></b>			
<b>Breskve</b>	<b>junij, julij</b> (zatiranje prvega in nadaljnjih rodov)		 <b>breskov zavijač</b>	ECODIAN CM (feromon) ali Affirm ali Coragen ali Lepinox plus ali Steward <b><u>Pokositi cvetočo podrast - varstvo čebel!!!</u></b>	
<b>8. škropljenje jablane (14 dni po prejšnjem)</b>	sredi junija	plodovi se razvijajo (debelijo)	<b>jablanov škrlup</b>  <b>jablanova pepelovka</b>  <b>jabolčni zavijač in listne uši</b>  <b>jabolčni zavijač</b>	Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC  <u>Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin...</u>  Calypso SC 480  Runner 240 SC ali Mimic ali Coragen ali Madex ali Madex max ali Carpovirusine	Škropimo samo po priporočilu javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Slovenije.  <b><u>Pokositi cvetočo podrast - varstvo čebel!!!</u></b>
<b>Slive in češplje</b>	Junij, julij in avgust		<b>češpljev zavijač</b>	Ecodian CF (feromon) ali Coragen  Uporaba metode konfuzije (Ecodian CF) je učinkovita, če je nasad izoliran.	
<b>Češnje</b>		začetek zorenja <b>češnjeva muha</b>	<b><u>Nu lure + registriran insekticid:</u></b>  Mospilan 20 SG ali Spada 200 EC  ali Naturalis	<b>Pri zgodnejših sortah zatiranje ni potrebno.</b>  Škropimo samo spodnji del krošnje na sončni (južni) strani.	

<b>9. škropljenje jablan (14 - 18 dni po prejšnjem)</b>	začetek do sredina julija	plodovi se razvijajo (debelijo)	<b>jablanov škrlup</b>	Antracol ali Delan ali Dithane ali Manfil ali Mankoz ali Merpan ali Orthocide 80 WG ali Pinozeb M-45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF ali Syllit 400 SC	
			<b>jablanova pepelovka</b>	Uporabimo močljivo žveplo (2 kg/ha), npr.: Cosan, Kumulus, Pepelin, Močljivo žveplo...	
			<b>jabolčni zavijač</b>	Madex ali Madex max ali Carpovirusine	
<b>10. škropljenje jablan (14 - 18 dni po prejšnjem)</b>	začetek avgusta		<b>jablanov škrlup</b>	Bellis ali Merpan ali Orthocide ali Thiram 80 WDG ali Boni protect	proti skladiščnim boleznim (čopičaste plesni, navadna sadna gniloba, siva plesen)
			<b>jabolčni zavijač</b>	Madex ali Madex max ali Carpovirusine	
<b>11. škropljenje (pozne sorte jablane)</b>	konec avgusta - začetek septembra		<b>jablanov škrlup in skladiščne bolezni</b>	Bellis ali Geoxe ali Boni protect ali Switch 62,5 WG	<b><u>Upoštevamo predpisane karence!</u></b>
<b>Češnje in višnje</b>		po obiranju	<b>češnjeva listna pegavost, češnjeva listna sušica</b>	Dithane ali Mankoz ali Merpan ali Octave	
<b>Breskve</b>		v času odpadanja listja	<b>ožig breskove skorje, breskov rak</b>	bakrov pripravek ali Topsin-M	

**POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO NAMENITI VSEM OPOZORILOM, KI SO NAVEDENA V NAVODILU ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA (št. dovoljenih tretiranj, fitotoksičnost, karenca, varnostni pasovi od voda I. in II. reda, varstvo čebel...).**

**PRED UPORABO PRIPRAVKA OBVEZNO NATANČNO PREBRATI PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA!!!**