

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV PRED BOLEZNIMI

Datum: 13. 6. 2017

Vremenske razmere v začetku junija so bile ugodne za okužbe s sadno/plodovo monilijo. Prav tako je večina sort že v fenološki fazi trdenja koščice. Po izkušnjah sadjarjev iz Primorske je sedaj optimalni čas za zatiranje bolezni. Za zatiranje se registrirani sledeči fungicidi:

| FITOFARM. SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA (dni) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Št. uporab letno |
| Chorus 50 WG | 0,6 kg/ha | 7 |
| Teldor SC 500 | 1,0 l/ha | 3 2xL |
| Teldor Plus | 1,5 l/ha | 3 |
| Rovral aquaflo | 1,5-2,25 l/ha | 3 |
| Switch 62,5 WG | 0,08 %, max 1 kg/ha | 14 2xL |
| Prolectus | max 1,2 kg/ha | 1 |
| Score 250 EC | 0,03%, max 0,45 l/ha | 7 2xL |
| Luna experience | max 0,6 l/ha | 7 2xL |

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN