



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

Datum: 31. 5. 20109

Krompir je v SV Sloveniji v različnih fazah razvoja. Zgodni krompir je že v fenološki fazi BBCH 407 (doseženo je do 70% skupne končne mase gomoljev), ostale sorte so v fenofazi začetka sklepanja vrst. Vremenske razmere v tretji dekadi maja so bile za okužbe s krompirjevo - paradižnikovo plesnijo izredno ugodne, Ullrich-Schroedter indeks je presegel vrednost 120, vendar prvih peg krompirjeve - paradižnikove plesni še nismo odkrili.

Priporočamo, da se posevki krompirja natančno pregledajo in da se opravi preventivno škropljenje z enim od spodaj naštetih kontaktnih fungicidov. V krompiriščih, kjer so vrste že sklenjene, priporočamo uporabo spodaj naštetih sistemskih in polsistemskih fungicidov.

Kontaktne fungicidi za zatiranje krompirjeve plesni so: Penncozeb 75 DG 1,7 kg/ha, Pinozeb M-25 2 kg/ha, Dithane M-45 2 kg/ha*, Dithane DG neotec 2 kg/ha*, Mankoz 75 WG 2 kg/ha*, Manfil 75 WG 2 kg/ha, Manfil 80 WP 2 kg/ha*, Manfil plus 75 WG 2,0 kg/ha*, Avtar 75 NT 2,0 kg/ha, Polyram DF 2 kg/ha, Antracol 2,5 kg/ha*(poraba zalog do 22.6. 2019), Antracol 70 WG 2,5 kg/ha* (poraba zalog do 22.6. 2019), Badge WG 3,0 kg/ha, Cuprablau Z 35 WG 2,1 kg/ha*, Cuprablau Z 35 WP 3,0 kg/ha*, Frownicide 0,4 l/ha, Winby 0,4 L/ha, Shirlan 500 SC 0,4 l/ha, Ranman top 0,5 l/ha, Enervin 2 kg/ha.

Polstemični in sistemski fungicidi so: Equation pro 0,4 kg/ha in Tanos 50 WG 0,7 kg/ha, Antracol combi WP 62,8 2,5 kg/ha *(poraba zalog do 22.6. 2019), Banjo forte 1,0 L/ha, Acrobat MZ WG 2 kg/ha*, Reboot 0,45 kg/ha, Cerial flex 0,6 kg/ha, Copforce extra 2,0 kg/ha, Forum MZ WG 2 kg/ha*, Moximate 725 WG 2,5 kg/ha, Moximate 725 WP 2,5 kg/ha, Moximate plus 2,5 kg/ha, Infinito 1,2-1,6 l/ha, Melody duo WG 66,8 2,5 kg/ha (poraba zalog do 22.6.), Revus 0,6 l/ha, Pergado MZ 2,5 kg/ha, Gett 2,5 kg/ha*, Ridomil Gold MZ pepite 2,5 kg/ha, Galben M 2,5 kg/ha, Electis 75 WG 1,5-1,8 kg/ha, Orvego 0,8 l/ha, Nautile DG 2 kg/ha, Nautile WP 2,25 kg/ha, Profilux 2,5 kg/ha, Curzate C extra 2,0 kg/ha, Proxanil 450 SC 2,0 – 2,5 L/ha, Curzate M 72,5 WG 2,3 kg/ha, Cymbal 0,2 do 0,25 kg/ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek ali Sacron 45 DG 0,22 kg /ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek ali Curzate partner 0,15 kg/ha + potrebno je dodati kontaktni pripravek.

Fungicidi označeni z *, so registrirani še za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (*Alternaria solani*).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN