

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV, NEKTARIN in MARELIC

Datum: 01.03.2019

Vremenske razmere v zadnjem tednu so pospešile razvoj breskev, nektarin in marelic. Brsti breskev in nektarin že nabrekajo (BBCH 51-53 ali nabrekanje cvetnih brstov-odpiranje brsta) in to predvsem na drevesih, ki rastejo na lažjih – peščenih tleh v mestu in na najbolj ugodnih – toplih, sončnih legah.



V fenološki fazi brstenja je nevarnost okužbe breskev in nektarin z **breskovo kodravostjo** velika, še posebej, če po toplen obdobju nastopi deževno vreme. **Breskova kodravost** je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev in pojav te bolezni ni mogoče napovedati, zato škropimo drevesa breskev in nektarin **preventivno**.

Pričakujemo da bodo prve okužbe z breskovo kodravostjo možne ob prvih napovedanih padavinah, še posebej če bodo temperature zraka v času padavin med 8 in 10°C, zato je potrebno breskve in nektarine poškopiti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V primeru ohladitve vremena in padca nočnih temperatur pod 0°C se škropljenje opravi šele po ponovni otoplitvi (nočne temperature nad 0°C) zaradi preprečitve morebitnih ožigov.

Za prvo škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi bakra:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha (le listna luknjičavost)
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2,0 kg/ha (le listna luknjičavost)
Cuprablau Z 35 WP	3,0 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP	1,8 kg/ha
Nordox 75 WG	2,0 kg/ha (le breskova kodravost)



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor tel.:
(02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82E-
pošta:info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Drevesa **marelic**, ki rastejo na zavetnih legah imajo prav tako že nabrekle brste. Za zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah** priporočamo uporabo bakrovega pripravka:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Drevesa naj bodo temeljito poškrpljena.

**PRED UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA JE
POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO !!!**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN