

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV in NEKTARIN

Datum: 12. 3. 2021

V nasadih **breskev in nektarin** nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti breskovi kodravosti v tem času uporabite pripravek **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha). Škropljenje je potrebno opraviti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V fenološki fazi začetka cvetenja **breskev in nektarin**, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: **Amylo-X** ali **Chorus 50 WG** ali **Luna experience** ali **Mavita 250 EC** ali **Prolectus** ali **Score 250 EC** ali **Signum** ali **Switch 62,5 WG** ali **Zenby** ali **Teldor SC500** (samo breskev!!!) ali **Topsin – M** (samo breskev!!!) v dovoljenih odmerkih.

Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN