



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>



120 LET

Obvestilo o varstvu koroze pred pleveli

Koruza je na njivah, kjer je bila opravljena zgodnja setev, že v fazi prvega do drugega lista (BBCH 10 -12). Na njivah, kjer ni bilo opravljeno škropljenje po setvi pred vznikom, lahko po vzniku koroze uporabite spodaj našete herbicide, ter nekatere herbicide, ki smo jih že našeli v Obvestilu o varstvu koroze pred vznikom. Pri izbiri herbicidov je potrebno upoštevati sestav plevelov, razvojno fazo plevelov ter razvojno fazo posevkov.

Pripravek	Odmerek	Fenološka faza uporabe	Za zatiranje
Po vzniku koroze in plevelov, za enoletne in večletne širokolistne pleveli			
Arrat (dikamba + tritosulfuron)+ močilo DASH	0,2 kg/ha	Po vzniku koroze do 2-6 listov BBCH 12-16. Prepovedan na najožjem VVO.	Enoletnega in večletnega širokolistnega plevela
Banvel 480 S (dikamba)	0,4-0,7 l/ha	Po vzniku koroze do 3 – 6 listov , BBCH 13 – 16. Prepovedan na najožjem VVO.	Enoletnega in večletnega širokolistnega plevela
Basagran 480 (bentazon)	1,5-2 l/ha	Po vzniku koroze do 1 – 6 listov , BBCH 11 – 16. Prepovedan na najožjem VVO.	Enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela
Cambio (bentazon+dikamba)	2-3 l/ha	Po vzniku koroze do 2-7 listov BBCH 12-17. Prepovedan na najožjem VVO.	Enoletnega in večletnega širokolistnega plevela
Mustang 306 SE (florasulam+2,4D DMA)	0,5 -0,6 l/ha	Po vzniku koroze, ko ima koroza 4 – 5 listov , BBCH 14 – 15.	Širokolistnega plevela
Bromotril 225 EC (bromotril oktanoant)	1,0-1,5 L/ha	Po vzniku koroze do 2 - 7 listov BBCH 12 -17 Prepovedan na najožjem VVO.	Širokolistni pleveli
Esteron (2,4D-2 EHE)	1 l/ha	Po vzniku koroze, ko ima koroza 4 – 6 listov , BBCH 14 – 16.	Enoletnega širokolistnega plevela
Herbocid (2,4 D)	1-1,5 l/ha	Po vzniku koroze, ko ima koroza od 3 – 6 listov , BBCH 13 – 16.	Širokolistnega plevela
Starane 2 (fluroksipir)	0,8 l/ha	Po vzniku koroze, ko ima koroza 3- 6	Širokolistnega plevela
Tomigan 200 EC	0,8 l/ha		

Tandus 200 EC Gat Stake 20 EC	1 l/ha 1 l/ha	listov, BBCH 13 – 16.	
Lontrel 100 (klopíralid)	1 – 1,2 l/ha	Po vzniku koruze, ko ima koruza 2- 5 listov. Prepovedan na najožjem VVO.	Širokolistnega plevla
Peak 75 WG (prosulfuron)+ močilo	20 – 30 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza največ 7 listov, plevel pa 6.	enoletnega širokolistnega plevla
Po vzniku koruze in plevelov, za enoletne in večletne širokolistne plevle in za ozkolistne plevle			
Aliseo plus (dikamba, nikosulfuron, rimsulfuron) z dodatkom močila TREND 90	350-440 g/ha Prepovedan na najožjem VVO	Tretira se po vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov (BBCH 12-16).	enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevla
Aliseo (nikosulfuron, rimsulfuron) + močilo TREND 90	70 g/ha Prepovedan na najožjem VVO.	po vzniku koruze in plevla, ko ima koruza od 2 do 8 listov (BBCH 12-18), plevel pa od 2 do 4 liste .	enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevla v koruzi za zrnje in silažo
nikosulfuron ; Motivell Motivell extra 6 OD Kelvin, Kelvin OD Nicosh Samson 4 SC Samson extra 6 OD Milagro 24SC Entail Bandera Primero	1-1,25 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1,0 l/ha 0,75 l/ha 170 ml/ha 170 ml/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha	Po vzniku, ko ima koruza 3-6 listov, plevel pa 2-6. Prepovedani na najožjem VVO.	enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevla, večletni ozkolistni plevli
Tarot 25 WG (rimsulfuron)	40-60 g/ha Prepovedan na najožjem VVO.	Po vzniku, ko ima koruza 2-8 listov BBCH 12-18, plevel pa 2-4.	ozkolistnega in širokolistnega plevel
Elumis (mezotrion + nikosulfuron)	1,5 L/ha Prepovedan na najožjem VVO.	Od razvojne faze koruze 1-2 listov (BBCH 11-12) do razvojne faze koruze največ osem listov (BBCH 18)	enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla
..Harmony 50 SX (tifensulfuron-metil) + močilo Trend 90	22,5 g/ha	koruza v razvojni fazi 2-8 listov (BBCH 12-18) in ko je plevel v fazi 2-4 pravih listov (BBCH 12-14).	enoletnega širokolistnega plevla
..Harmony 50 SX (tifensulfuron-metil) + močilo Trend 90	10 - 15 g/ha	koruza v razvojni fazi 2-8 listov (BBCH 12-18) in ko je plevel v fazi 2-4 pravih listov (BBCH 12-14).	enoletnega širokolistnega plevla
Laudis(tembotrion) Laudis WG 30	1,15 – 2,5 l/ha 0,25 - 0,5 kg/ha	Po vzniku, ko ima koruza 2-8 listov BBCH 12-18, širokolistni plevel pa 2-8, ozkolistni 2 lista.	ozkolistnega in širokolistnega plevla
Equip (foramsulfuron)	2-2,5 l/ha	Po vzniku, ko ima	širokolistnega in

		koruza 2-6 listov BBCH 12-16.	ozkolistnega plevela
Maister OD (foramsulfuron+jodosulfuron-metil natrij)	1,5 l/ha	Po vzniku, ko ima koruza 2-6 listov BBCH 12-16.	ozkolistnega in širokolistnega plevela
Callisto 480 SC (mezotrion)+ močilo	0,15-0,25 l/ha	Pred in po vzniku do razvojne faze največ 8 listov koruze	širokolistnega plevela in navadne kostebe
Arigo (mezotrion+nikosulfuron+rimsulfuron)	330 g/ha +močilo Trend 90 Prepovedan na najožjem VVO.	po vzniku koruze, v fenološki fazi od dveh do osmih listov koruze.	enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, TER PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA. VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, PRAVILNO HRANITI PRIPRAVKE IN EMBALAŽO.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN