

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Datum: 6. 3. 2020

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih **breskev in nektarin** nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti breskovi kodravosti v tem času uporabite pripravek **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha) ali **Syllit 544 SC** (1,65 L/ha). Škropljenje je potrebno opraviti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V fenološki fazi začetka cvetenja **breskev in nektarin**, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: **Amylo-X** ali **Chorus 50 WG** ali **Luna experience** ali **Mavita 250 EC** ali **Prolectus** ali **Score 250 EC** ali **Signum** ali **Switch 62,5 WG** ali **Zanby** ali **Teldor SC500** (samo breskev) ali **Topsin – M** (samo breskev) v dovoljenih odmerkih.

Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

VARSTVO MARELIC

V fenološki fazi začetka cvetenja **marelic**, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: **Amylo-X** ali **Chorus 50 WG** ali **Duaxo koncentrat** ali **Mavita 250 EC** ali **Prolectus** ali **Score 250 EC** ali **Switch 62,5 WG** ali **Signum** ali **Serenade ASO** ali **Topsin – M** ali **Zanby** v dovoljenih odmerkih.

Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ TER SLIV IN ČEŠPELJ

Češnje in višnje ter slive in češplje so v fenološki fazi napenjanja brstov. V tej fenološki fazi je čas za škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev. Uporabite lahko pripravek **Badge WG** (3,5 kg/ha) ali **Champion 50 WG** (2-3 kg/ha) ali **Cuprablau Z 35 WG** (1,6-2 kg/ha) ali **Cuprablau Z 35 WP** (2 kg/ha).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.