

## OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

**Datum: 4.3.2021**

---

### VARSTVO MARELIC

V fenološki fazi začetka cvetenja marelic, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: Amylo-X ali Chorus 50 WG ali Duaxo koncentrat ali Mavita 250 EC ali Prolectus ali Score 250 EC ali Switch 62,5 WG ali Signum ali Serenade ASO ali Topsin – M ali Zenby v dovoljenih odmerkih.

Naštetna sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

### VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ TER SLIV IN ČEŠPELJ

Češnje in višnje ter slive in češplje so v fenološki fazi napenjanja brstov. V tej fenološki fazi je čas za škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev. Uporabite lahko pripravek Badge WG (3,5 kg/ha) ali Champion 50 WG (2-3kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WG (1,6-2 kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha).

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN