

## OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

**Datum: 10. 4. 2018**

---

### Varstvo česenj in višenj:

Česnje in višnje so v SV Sloveniji v različnih fenoloških fazah, od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) do začetka cvetenja (BBCH 60). Priporočamo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji** v času, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov: **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na meter višine krošnje, oz. maks. 3,3 L/ha) ali **Luna experience** (0,2 L/ha/1m višine krošnje oz maks. 0,6 L/ha) ali **Rovral aquaflo** (samo na češnji 1,5 L/ ha) ali **Signum** (0,25 kg/ha na m višine krošnje, max. 0,75 kg/ha ) ali **Switch 62,5 WG**, v konc. 0,08% oz.. maks. 1,0 kg/ha (samo za česnje) ali **Teldor SC 500** in **Teldor plus** (samo na češnji 0,5 L/ha na 1m višine krošnje) ali **Topsin M** (samo češnja, 1 kg/ha) ali **Serenade ASO** (samo češnja, 8 L/ha) ali **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg na ha).

### Varstvo sliv in češpelj

Slive in češplje so v fenološki fazi od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) pa do polnega cvetenja (BBCH 65). Za zatiranje **cvetne monilije** v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi) priporočamo enega od naslednjih pripravkov: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha, samo na slivi) ali **Luna experience** (samo na slivi 0,2 L/ha/m višine krošnje oz maks. 0,6 L/ha) ali **Rovral aquaflo** (1,5 L/ha) ali **Signum** (samo na slivi v 0,25 kg/ha na m višine krošnje, max. 0,75 kg/ha) ali **Switch 62,5 WG**, v konc. 0,08% oz.. maks. 1,0 kg/ha (samo na slivi) ali **Teldor SC 500** in **Teldor plus** (0,5 L/ha na 1m višine krošnje) ali **Topsin M** (samo na slivi 1 kg/ha) ali **Serenade ASO** (samo na slivi, 8 L/ha) ali **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg na ha).

Za spremljanje populacije **rumene ali črne češpljeve grizlice** priporočamo obešanje belih lepljivih plošč. Samo v primeru, če se je na bele lepljive plošče ulovilo skupno več kot 30 osic, lahko takoj **po cvetenju (ko odpade večino venčnih listov)** uporabite pripravek **Mospilan 20 SG** ali **Mospilan SG** ali **Moksycan SG** vse v 0,04% konc.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN