



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH

Na strniščih se razvijajo večletni pleveli kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje), navadni pelin, navadni regrat, robide, trpotci, divji sirek, ostrice (*Cyperus*), ki jih v posameznih kulturah (npr. oljne buče) težje zatremo. Hkrati zatiramo tudi enoletne plevela (pelinolistno ambrozijo in druge).

Strnišča pustimo, da pleveli razvijejo dovolj listne mase, kar je pogoj za učinkovito delovanje herbicidov na osnovi aktivne snovi glifosat.

Za zatiranje plevelov na strniščih je mogoče uporabiti sledeče herbicide na osnovi aktivne snovi glifosat:

- **Boom efekt ali BQM** - 2-3 l/ha za enoletne plevela ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevela;
- **BQM super** - 2-4 l/ha za enoletne plevela ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevela, odvisno od posamezne vrste plevela;
- **Clinic 360 SL** - 1,5 – 2 l za enoletne plevela ter od 4 do 10 l/ha za večletne plevela;
- **Dominator ultra 360 SL** - 2-4 l/ha za enoletne plevela, 2,5 -10 l/ha za večletne plevela;
- **Helosate 450 SL ali Helosate 450 TF** – 4 l/ha na strnišču;
- **Kyleo** - 3-5 l/ha na strnišču;
- **Roundup energy**- 1,5- 3 l/ha za enoletne plevela, 2,5 do 8 l/ha za večletne plevela;
- **Roundup star** v odmerku do 5,0 L/ha
- **Roundup flex**- 1,4- 2,8 l/ha za enoletne plevela, 2,3 do 7,5 l/ha za večletne plevela;
- **Roundup max** – 2-4 l /ha za enoletne plevela, 2,5 do 10 l/ha za večletne plevela
- **Roundup ultra** – 2-4 l /ha za enoletne plevela, 2,5 do 10 l/ha za večletne plevela;
- **Shyfo** – 1,5-3 l/ha za enoletne plevela, 2 - 5 l/ha za večletne plevela;
- **Touchdown system 4** - 2-3 l/ha za enoletne plevela ter 4-8 l/ha za večletne plevela;
- **Tajfun 360** - 2-4 l/ha za enoletne plevela, 2,5 -10 l/ha za večletne plevela

Na strnišči, kjer ni prisotnih ozkolistnih plevelov – travnih plevelov, je mogoče namesto zgoraj naštetih herbicidov uporabiti **Banvel 480 S** v odmerku **0,75 L/ha** in **Banvel 4 S** v odmerku **1,0 do 1,5 L/ha**.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih

-
-

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>



120 LET

OPOZORILO O ZATIRANJU PELINOLISTNE AMBROZIJE

Pelinolistna ambrozija se širi počasi, a vztrajno. Na dobrem zemljišču zraste tudi do 2 m, bogato semeni do 100.000 semen na rastlino, seme v zemlji ostane kaljivo do 13 let. Poleg gospodarske škode, ki jo povzroča na nekmetijskih in kmetijskih površinah, povzroča tudi **zdravstvene težave pri ljudeh - v obliki alergij**, cvetni prah pelinolistne ambrozije je alergen.

Ambrozija na kmetijskih zemljiščih se pogosto pojavlja tudi na strniščih po žetvi žit in oljne ogrščice ter ob robovih posejanih njiv korus, oljnih buč, krompirja, vrtnin. Potrebno je tudi **očistiti robove njiv**, mehansko ali kemično, (večkratna košnja, mulčenje ali škropljenje s herbicidi).

Na strniščih jo zatiramo tako, da počakamo, da ambrozija ozeleni do višine 10 cm in uporabimo enega izmed neselektivnih herbicidov na osnovi glifosata, ki so registrirani za uporabo na strniščih (**OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH**). S tem preprečimo semenitev ambrozije.

Opozarjamo, da pregledujete svoja zemljišča in preprečite, da ambrozija zacveti in semeni.

Po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Uradni list RS št. 63/2010) morate sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (*A. artemisiifolia*) in druge neofitne vrste iz rodu *Ambrosia* (*A. trifida*, *A. maritima*, *A. coronopifolia*). **Imetniki zemljišč ste dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.**

Na spletni strani MKGP- Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so objavljena **Priporočila za zatiranje ambrozije.**

(http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/skodljive_rastline/)

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih

-
-

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN