



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

---

## OBVESTILO O ZATIRANJU OREHOVE MUHE

Datum: 12.7.2018

---

Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve osebkne orehove muhe. Ulov muhe ni enakomeren na vseh spremljanih lokacijah, zato priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do začetka prvega ulova) rumene lepljive plošče. Za spremljanje orehove muhe priporočamo uporabo rumenih lepljivih plošč z dodatkom atraktanta. V nasadih oreha, kjer je bila v preteklem letu ugotovljena velika škoda od orehove muhe, priporočamo škropljenje do 5 dni po prvem ulovu orehove muhe na rumene lepljive plošče.

Za zatiranje je mogoče uporabiti **Laser 240 SC** v odmerku 0,15 l/ha ali **Laser plus** v odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode **do** 3 L na odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. **Nutrel** (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). **Tretira se le tretjino drevesne krošnje** (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje naj se uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da se na rumene lepljive plošče po tretiranju še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je potrebno ponoviti tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 mm dežja), ko se rastline posušijo, vreme pa vsaj deloma ustali. Pripravek Laser 240SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni.

Namesto pripravka Laser je mogoče uporabiti tudi pripravek **Calypso SC 480** (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni) ali **Imidan 50WG** (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. **Nutrel**. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN