

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum: 9. 10. 2017

Številka: 15

Po škropljenju z UREO bo pričelo listje jablan hitreje dozorevati in odpadati. V času odpadanja listja nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, **je potrebno v času odpadanja listja opraviti škropljenje z enim spodaj naštetih bakrovih pripravkov**. V primeru, da je v nasadu prisoten hrušev ožig oz. jablanov rak, lahko uporabite pripravek **Biotip bakrov fungicid plus** v 0,75% konc. ali **Cuprablau Z 35 WP** (za zatiranje jablanovega škrlupa) v 3 kg/ha, samo proti jablanovemu raku pa pripravek **Nordox 75 WG** v odmerku 1,6 kg/ha.

V nasadih, kjer škropljenje z UREO ne bo opravljeno, se bo odpadanje listja pričelo nekoliko pozneje, to je ob ohladitvi vremena (nizke nočne temperature) in obilnejših padavinah.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so navedena v navodilih za uporabo.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN