

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum: 2.9.2020

Številka: 18

V zadnjih nekaj dneh je na nekaterih delih severovzhodne Slovenije padlo 30 mm in več padavin (ponekod tudi toča) in ker je bila škropilna obloga izprana priporočamo za preprečevanja okužb s **pozni škrlupom in skladiščnimi boleznimi** v nasadih sort, kot so 'Jonagold', 'Zlati delišes'..., uporabo enega izmed naslednjih fungicidov: **Amylo – X** (1,5-2,5 kg/ha) ali **Bellis** (0,8 kg/ha; karenca 7 dni) ali **Geoxe** (0,45 kg/ha; karenca 3 dni) ali **Pomax** (1,6 L/ha; karenca 5 dni) ali **Switch 62,5 WG** (1 kg; karenca 3 dni) ali **Vitisan** (2,5 kg/ha; karenca 1 dan) ob upoštevanju karenčne dobe!!!

V ostalih nasadih (poznejše sorte, kot so 'Idared', 'Braeburn', 'Fuji'...) je še vedno mogoče uporabiti enega od naslednjih fungicidov: **Merpan 80 WDG** v 1,88 kg/ha (karenca 28 dni), **Orthocide 80 WG** v 2,0 kg/ha (karenca 28 dni), **Scab 480 SC** v 3,13 L/ha (karenca 21 dni), **Scab 80 WG** v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni), **Zato plus** v 1,9 kg/ha (karenca 35 dni) ali **Zato 50 WG** ali **Flint** v odmerku 0,1 - 0,15 kg/ha (karenca 21 dni) ob upoštevanju karenčne dobe!!!

V nasadih poznih sort, ki jih je prizadela **toča** priporočamo uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**, v ostalih nasadi pa uporabo enega izmed pripravkov s krajšo karenčno dobo (**Amylo-X** ali **Bellis** ali **Geoxe** ali **Pomax** ali **Switch 62,5 WG** ali **Vitisan**). Priporočamo tudi dodajanje »foliarnih« gnojil na osnovi aminokislin, izvlečkov alg ali sredstva za krepitev rastlin. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karenčnih dob, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN