

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Datum: 4. 4. 2018

Številka: 2

Jablane so na najbolj zgodnjih legah že dosegle fenološko fazo C - C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53-54.

V času zadnjih padavin smo na lovilcu spor zabeležili posamezne askospore **jablanovega škrupa**, vendar bodo prvi izbruhi askospor možni šele ob naslednjih obilnejših padavinah. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje mokro vsaj 15 ur ali več in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno. V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poskropiti jablane in hruške, ki so v razvoju hitreje in to **še pred napovedanimi padavinami**.

Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov: **Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Champion 50 WG v 0,25 % konc. (samo stara etiketa), Kocide 2000 (2 kg/ha) ali Biotip bakrov fungicid plus v 0,5 % konc.**

Do fenološke faze C - D (BBCH 53 – BBCH 56) lahko uporabite mineralni olji **Frutapon**, (staro ime: **Belo olje-Frutapon**) ali **Ovitex** ali olje ogrščice **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat**. Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine, večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

V letošnjem letu beležimo v nasadih jablan v bližini gozdov močan napad **jablanovega cvetožera**. Na posameznih lokacijah smo ob pregledu brstov našli visok odstotek (nad 75%) nabodenih brstov, vendar še brez odloženih jajčec. Pričakujemo, da bomo prva odložena jajčeca našli v naslednjih dneh. Priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste iz dreves v bližini gozda in v primeru, da je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku), priporočamo uporabo pripravka **Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha**. Jablane se lahko tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja (uporaba dovoljena enkrat v eni rastni dobi). Pripravek je strupen za čebele, zato je potrebno pred njegovo uporabo cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi.

Po izkušnjah iz tujine priporočajo zniževanje pH vrednosti škropilne brozge, katere vrednost za optimalno delovanje pripravka Imidan 50 WG naj znaša med 6 – 6,5.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN