

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum: 10.3.2020

Številka: 2

Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C – C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Pregled zimskih plodišč **jablanovega škrlupa** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih že dozorele. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokri daljši čas (pri povprečni temperaturi 8°C - 20 ur) in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno in kjer so jablane dosegle zgoraj omenjeno fenološko fazo.

V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poškropiti jablane in hruške, ki so v razvoju hitreje in to **še pred napovedanimi padavinami**. Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov: **Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha)** ali **Kocide 2000 (2 kg/ha)**. **Vsi naštetni bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.**

V nekaterih nasadih smo ujeli hroščke **jablanovega cvetožerja**, našli smo tudi vbode, na nekaterih lokacijah pa tudi že odložena jajčeca. Priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku).

V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo pripravka **Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha**. Jablane se lahko tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja (uporaba dovoljena enkrat v eni rastni dobi). **Pripravek je strupen za čebele**, zato je potrebno pred njegovo uporabo cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). **Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi.**

Po izkušnjah iz tujine se priporoča znižanje pH vrednosti škropilne brozge, katere vrednost za optimalno delovanje pripravka Imidan 50 WG naj znaša med 6 – 6,5.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN