

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum: 11. 4. 2018

Številka: 3

Razvoj sadnega drevja je v zadnjem tednu zaradi visokih dnevni temperatur hitro napredoval. Sorte jablan, ki so v razvoju hitreje (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: zeleni popek - rožnati popek (D-E po Fleckingerju oz. 56 - 57 po BBCH skali).

Do prvih primarnih okužb z **jablanovim škrlupom** bo prišlo šele v primeru, ko bo zaradi padavin listje mokro vsaj 10 ur ali več. Zato je potrebno spremljati vremensko napoved. V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poskropiti jabolane in hruške **še pred napovedanim dežjem**.

Za naslednje škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi obilnimi padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Pencozeb 75 DG, Pinozeb M 45**), a.s. metiram (**Polyram DF**), propineb (**Antracol, Antracol WG 70**) ali tiram (**Thiram 80 WG**) ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO**) ali dodina (**Syllit 400 SC**). Mogoče je uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Chorus 50 WG, Faban, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi v primeru napovedi dolgotrajnih padavin.

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti pripravek **Syllit 400 SC** (1,9 L/ha, uporaba brez mešanja z ostalimi FFS) ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: **Chorus 50 WG** (0,45 kg/ha) ali **Mythos** (1,5 L/ha) ali **Pyrus 400 SC** (1 L/ha) ali **Faban** (1,2 L/ha) ali **Clarinet** (1- 1,5 L/ha) ali **Scala** (1,125 L/ha). Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov razen pripravkoma Faban in Syllit.

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na **jablanovo pepelovko** (idared, jonagold...), priporočamo, pri temperaturi nad 15°C, dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet** ali **Vindex 80WG** v odmerku 5 do 8 kg/ha ali **Pol-Sulphur 800SC** oz. **Symbiotica Fito** – tekoče žveplo v odmerku 6 do 7,5 L/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN