

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum: 21. 3. 2019

Številka: 3

Razvoj sadnega drevja je v zadnjem tednu zaradi nižjih temperatur nekoliko počasneje napredoval. Sorte jablan, ki so v razvoju hitreje (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: zeleni popek (D po Fleckingerju oz. 56 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili prvi izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Število izbruhanih askospor je bilo sicer zelo majhno in tudi primarne okužbe zaradi nizkih temperatur niso bile mogoče.

Pričakujemo, da bodo v času naslednjih obilnejših padavin izbruhi askospor občutno močnejši. V primeru vremenske napovedi s padavinami je zato potrebno jabolane in hruške poškopiti **še pred napovedanim dežjem**.

Za naslednje škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45**), a.s. metiram (**Polyram DF**), propineb (**Antracol, Antracol WG 70**, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali tiram (**Thiram 80 WG**, zaloge v uporabi do 30.4.2019) ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO**) ali dodina (**Syllit 400 SC, Syllit 544 SC**). Mogoče je uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Chorus 50 WG, Faban, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi v primeru napovedi dolgotrajnih padavin.

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti pripravek **Syllit 400 SC, Syllit 544 SC** (uporaba brez mešanja z ostalimi FFS) ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: **Chorus 50 WG** ali **Mythos** ali **Pyrus 400 SC** ali **Faban** ali **Scala**. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov razen pripravkom Faban in Syllit.

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na **jablanovo pepelovko** (idared, jonagold..), priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet** ali **Vindex 80WG** v odmerku 5 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800SC** oz. **Symbiotica Fito – tekoče žveplo** v odmerku 6 do 7,5 L/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN