

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV PRED BOLEZNIMI

Datum: 13. 6. 2018

Vremenske razmere v začetku junija so bile ugodne za okužbe s sadno/plodovo monilijo. Prav tako je večina sort že v fenološki fazi trdenja koščice. Po izkušnjah sadjarjev iz Primorske je sedaj optimalni čas za zatiranje bolezni. Za zatiranje se registrirani sledeči fungicidi:

FITOFARM. SREDSTVO	ODMEREK	KARENCA (dni)
		Št. uporab letno
Chorus 50 WG	0,6 kg/ha	7
Teldor SC 500	1,0 l/ha	3 2xL
Switch 62,5 WG	0,08 %, max 1 kg/ha	14 2xL
Prolectus	max 1,2 kg/ha	1
Score 250 EC Mavita 250 EC	0,03%, max 0,45 l/ha	7 2xL
Signum	Max 0,75 kg/ha	7 2xL
Luna experience	max 0,6 l/ha	7 2xL

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN