

## OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

**Datum: 23.05. 2018**

**Številka: 4**

Vinska trta je trenutno na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, dosegla fenološko fazo BBCH 61 (začetek cvetenja). V tem obdobju je vinska trta, še posebej kabrniki, zelo občutljiva na okužbe s peronosporo vinske trte.

Zaradi pogostih padavin in toplega vremena je rast vinske trte zelo intenzivna. Pogoste padavine so povzročile začetek več primarnih okužb s **peronosporo vinske trte**, pojav katere smo zasledili že na večih lokacijah. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polysistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato duo** (2-3 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Antracol combi WP 62,8** (2,5 kg/ha) ali **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Galben M** (2,5 kg/ha) ali **Gett** (2,5 kg/ha) ali **Melody combi WG 65,3** (1,5 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Mildicut** (3 L/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Moximate 725 WG oz. WP** (1,9 kg/ha) ali **Moximate plus** (1,9 kg/ha) ali **Nautile DG** (2,4 kg/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado F** (1,6 kg/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Profilux** (1,25 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Ridomil gold combi Pepite** (2 kg/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha). Presledki med škropljenji s kombiniranimi pripravki naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Vremenske razmere za pojav **oidija vinske trte** so izredno ugodne, saj je indeks tveganja za okužbo z oidijem (kast OIDIAG) na nekaterih spremljanih lokacijah presegel vrednost 90%, kar pomeni zelo veliko nevarnost za pojav in razvoj oidija. Vrednost indeksa, ki predstavlja visoko tveganje za okužbo oz. širjenje bolezni, znaša 66%.

Zato za preprečitev okužbe s to boleznijo priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Collis SC** (0,4 L/ha) ali **Crystal** (0,2 L/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Dynali** (0,65 L/ha) ali **Falcon EC 460** (0,4 L/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,6 L/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 L/ha) ali **Mavita** (0,2 L/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 L/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 L/ha) ali **Postalon 90 SC** (1 do 1,25 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha) ali **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha) ali **Talendo** (0,25 L/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 L/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Topaze** (0,3 L/ha) ali **Vivando** (0,16 L/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 L/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Prve ličinke **ameriškega škržatka** – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v SV Sloveniji ujeli 15. maja. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Melody combi WG 65,3**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Mikal flash**, **Ridomil gold combi Pepite**, **Mikal premium F** in **podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv** ali **podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.**

**V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**