

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

Datum: 10. 5. 2019

Številka: 4

Rast mladic vinske trte zaradi nizkih temperatur v zadnjem tednu ni bistveno napredovala. Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 16 - 53 (6 listov razprtih do socvetja jasno vidna). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 14-15 (razprtih 4 – 5 listov).

V času od 3. do 9. maja je na področju SV Slovenije padlo do 50 mm padavin, kar pomeni, da so bili na toplejših vinogradniških legah izpolnjeni pogoji za začetek primarne okužbe s **peronosporo vinske trte**. Ker so v naslednjih dneh napovedane nove padavine, priporočamo, da se škropljenje proti tej bolezni opravi čimprej oziroma najkasneje do konca prihodnjega tedna.

Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov, kot so: **Antracol** ali **Antracol WG 70** (2,0 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali **Avtar 75 NT** (2 kg/ha) ali **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Delan pro** (3 L/ha) ali **Dithane DG neotec** ali **Dithane M 45** (2,0 kg/ha) ali **Folpan 50 SC** (2L/ha) ali **Folpan 80 WDG** (1,25 kg/ha) ali **Follow 80 WG** (1,25 kg/ha) ali **Manfil 75 WG** (2,0 kg/ha) ali **Manfil 80 WP** (2,0 kg/ha) ali **Manfil plus 75 WG** (2,0 kg/ha) ali **Mankoz 75 WG** (2 kg/ha) ali **Mildicut** (2 L/ha) ali **Penncozeb 75 DG** (2,0 kg/ha) ali **Pinozeb M-45** (2,0 kg/ha) ali **Polyram DF** (2,4 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Videryo** (2,5 L/ha) ali **Vincyia F** (2,5 L/ha).

Proti **oidiju** lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla, kot so **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito** – tekoče žveplo (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito** – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil **oidij** in kjer pri prejšnjem škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite kombiniran pripravek (proti peronospori in oidiju) **Universalis** (2 L/ha). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravka **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha).

V primeru toče dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (**Folpan 80 WDG** ali **Folpan 50 SC** ali **Follow 80 WG**).

Zaradi nizkih temperatur in s tem manjšega prirasta vinske trte se predvsem na sortah 'Sauvignon', 'Laški rizling' in 'Šipon' v večjem obsegu pojavlja **trdna kodravost** ali **akarinoza** ter **erinoza**. Za zmanjšanje pojava le-teh lahko uporabite pripravek **Vertimec pro** v 0,1% konc. (uporaba 2x letno).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.