

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

Datum: 07.06. 2018

Številka: 5

Vinska trta je trenutno na ugodnejših legah in sortah, ki so hitreje v razvoju, že odcvetela, pri poznejših sortah pa je cvetenje v zaključni fazi - fenološka faza BBCH 67 – 68 (70 – 80% odpadlih cvetnih kopic).

Zaradi pogostih padavin in toplega vremena je rast vinske trte zelo intenzivna. Pogoste lokalne padavine pa omogočajo začetek novih primarnih okužb s **peronosporo vinske trte**. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato duo** (2-3 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Antracol combi WP 62,8** (2,5 kg/ha) ali **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Galben M** (2,5 kg/ha) ali **Gett** (2,5 kg/ha) ali **Melody combi WG 65,3** (1,5 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Mildicut** (3 L/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Moximate 725 WG oz. WP** (1,9 kg/ha) ali **Moximate plus** (1,9 kg/ha) ali **Nautile DG** (2,4 kg/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado F** (1,6 kg/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Profilux** (1,25 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Ridomil gold combi Pepite** (2 kg/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha). Presledki med škropljenji s kombiniranimi pripravki naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Vremenske razmere za pojav **oidija vinske trte** so izredno ugodne, zato za preprečitev okužbe s to boleznijo priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Collis SC** (0,4 L/ha) ali **Crystal** (0,2 L/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Dynali** (0,65 L/ha) ali **Falcon EC 460** (0,4 L/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,6 L/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 L/ha) ali **Mavita** (0,2 L/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 L/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 L/ha) ali **Postalon 90 SC** (1 do 1,25 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha) ali **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha) ali **Talendo** (0,25 L/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 L/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Topaze** (0,3 L/ha) ali **Vivando** (0,16 L/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 L/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Ameriški škržatek – prenašalec zlate trsne rumenice, se trenutno nahaja v stadiju ličinke L2 in L3. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Melody combi WG 65,3**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Mikal flash**, **Ridomil gold combi Pepite**, **Mikal premium F in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.