

## OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

**Datum: 22. 5. 2019**

**Številka: 5**

Rast mladic vinske trte zaradi nizkih temperatur v zadnjem tednu ni bistveno napredovala. Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 16 - 53 (6 listov razprtih do socvetja jasno vidna). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 14-15 (razprtih 4 – 5 listov).

V zadnjih dneh (19. oz. 20. maja) so bili na področju SV Slovenije izpolnjeni pogoji za začetek primarnih okužb s **peronosporo vinske trte**, katerih inkubacije se bodo zaključile predvidoma do 28. maja. Priporočamo, da se škropljenje proti tej bolezni opravi najkasneje do izteka inkubacije.

Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov, kot so: **Antracol** ali **Antracol WG 70** (2,0 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali **Avtar 75 NT** (2 kg/ha) ali **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Delan pro** (3 L/ha) ali **Dithane DG neotec** ali **Dithane M 45** (2,0 kg/ha) ali **Folpan 50 SC** (2L/ha) ali **Folpan 80 WDG** (1,25 kg/ha) ali **Follow 80 WG** (1,25 kg/ha) ali **Manfil 75 WG** (2,0 kg/ha) ali **Manfil 80 WP** (2,0 kg/ha) ali **Manfil plus 75 WG** (2,0 kg/ha) ali **Mankoz 75 WG** (2 kg/ha) ali **Mildicut** (2 L/ha) ali **Penncozeb 75 DG** (2,0 kg/ha) ali **Pinozeb M-45** (2,0 kg/ha) ali **Polyram DF** (2,4 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Videryo** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Proti **oidiju** lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla, kot so **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močnejše pojavil **oidij** in kjer pri prejšnjem škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite kombiniran pripravek (proti peronospori in oidiju) **Universalis** (2 L/ha). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravka **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha).

V primeru toče dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (**Folpan 80 WDG** ali **Folpan 50 SC** ali **Follow 80 WG**).

Zaradi nizkih temperatur in s tem manjšega prirasta vinske trte se predvsem na sortah 'Sauvignon', 'Laški rizling' in 'Šipon' v večjem obsegu pojavlja **trsna kodravost** ali **akarinoza** ter **erinoza**. Za zmanjšanje pojava le-teh lahko uporabite pripravek **Vertimec pro** v 0,1% konc. (uporaba 2x letno, sredstvo se ne meša z drugimi FFS).

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**