



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00
fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

Datum: 27. 6. 2012

Številka: 6

Vremenske razmere na področju SV Slovenije so zelo ugodne za pojav in širjenje peronospore vinske trte, saj se je posebej še v bujnejših vinogradih že začela pojavljati.

Za preprečevanje okužb s peronosporo vinske trte zato priporočamo uporabo naslednjih pripravkov: **Acrobat MZ** v 0,25% konc. ali **Antracol combi** v 0,2% konc. ali **Aviso DF** v 0,25% konc. ali **Curzate M** v 0,3% konc. ali **Equation pro** v 0,04% konc. ali **Fantic F WG** v 0,2% konc. ali **Forum star** v 0,175% konc. ali **Melody duo** v 0,25% konc. ali **Melody combi WP 43,5** v 0,25% konc. ali **Melody combi WG 65,3** v 0,15% konc. ali **Mikal Flash** v 0,35% konc. ali **Mikal premium F** v 0,3% ali **Pergado F** 0,16 % (1,6 kg/ha) ali **Pergado MZ** 0,16% (1,6 kg/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** v 0,25% konc. ali **Ridomil gold combi** v 0,2% ali **Revus** v 0,04 do 0,06% ali **Verita** v 0,25% konc. ali **Verita profiler** v 0,25 do 0,3% konc. ali **Valis F** (1,5 kg/ha).

Mogoče je uporabiti še pripravke **Electis 75 WG** v 0,15 do 0,18% (1,5 do 1,8 kg/ha) ali **Mildicut** (4,0 l/ha) ali **Universalis** (2,0 l/ha) ali **Cabrio top** (2,0 kg/ha). Pripravka Universalis in Cabrio top delujeta hkrati tudi na oidij vinske trte.

Pripravkom **Revus**, **Verita**, **Quadris** in **Equation pro** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov kot so: **Delan 700 WG** ali **Folpan 80 WDG** ali **Antracol**, **Antracol WG 70** ali **Dithane DG neotec**, **Dithane M 45**, **Kor DG** ali **Manfil 75 WG** ali **Manfil 80 WP** ali **Pinozeb M 45** ali **Penncozeb 75 DG** ali **Polyram DF** v vsaj polovičnem odmerku.

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini padavin (če pade več kot 30 l/m² je potrebno škropljenje opraviti prej) in prirastu mladice.

Za preprečitev okužbe z oidijem priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: **Crystal** v 0,015 do 0,02%, **Collis SC** 0,03 do 0,04%, **Falcon EW 460** v 0,03 do 0,04%, **Folicur EW 250** v 0,03%, **Orius 25 EW** v 0,03%, **Mystic** 0,04%, **Karathane Gold 350 EC** v 0,05%, **Nativo 75 WG** v 0,018%, **Postalon 90 SC** v 0,1 do 0,125%, **Stroby WG** v 0,02%, **Vivando** 0,016 do 0,02%, **Talendo** v 0,025% konc. ali **Tebusha 25% EW** v odmerku 0,4 l/ha. Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: **Domark 100 EC** v 0,025%, **Topas 100 EC** v 0,025%.

Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so **0,3% Cosan** ali **0,3% Vindex 80 WG** v **0,3 %** ali **0,3% Kumulus DF** ali **0,3% Močljivo žveplo** ali **0,3 % Pepelin** ali **0,3% Thiovit jet**.

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi in Mikal premium F). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Let metuljčkov drugega rodu grozdnih sukačev se je na večini spremljanih lokacij začel okrog 22. junija. Menimo, da bo optimalni termin za uporabo dovoljenih pripravkov kot so: **Affirm**, **Coragen**, **Runner**, **Mimic**, **Steward** ali **Delfin**, v času med 30. junijem in 7. julijem. Omenjeni insekticidi na ameriškega škržatka ne kažejo nobenega učinka.

Uporabo specifičnih fungicidov–botriticidov priporočamo preden se jagode v grozdu strnejo. Uporabimo lahko enega od naslednjih pripravkov: **Cantus WG**, **Switch 62,5 WG**, **Teldor SC 500**, **Mythos**, **Pyrus 400 SC**, **Rovral Aquaflo** ali pripravek **Botector**, ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kopic do razvojne faze, ko so jagode zrele.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN